

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRI PAL **PAMI 2026**

En todos los casos deben presentar dni y acreditación de afiliación de PAMI y proceder a su validación previa.

SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA:

- AFILIADOS MAYORES DE 65 AÑOS
- EMBARAZADAS
- NIÑOS MENORES ENTRE 6 Y 24 MESES (1/2 dosis de adulto)

CON PRESCRIPCIÓN MÉDICA:

AFILIADOS ENTRE 2 Y 64 AÑOS

PARA VALIDARLA SE DEBE INGRESAR A
WWW.FACAF.ORG.AR

La vacuna está disponible sin costo para los afiliados a PAMI en cualquiera de las farmacias habilitadas.

Para recibirla:

- Los afiliados mayores de 65 años deben presentar únicamente **DNI y Credencial PAMI**.
- Los afiliados menores de 65 años deben presentar también **indicación médica escrita con el diagnóstico que lo justifique**.

Personas Trabajadoras de PAMI (Planta o Contratados) que: - Tengan 65 años o más (Recomendado)

SÍ NECESITAN ÓRDEN MÉDICA:

1) Personas Afiliadas

NO NECESITAN ORDEN MÉDICA:

1) Personas Afiliadas

2) Personas Trabajadoras de PAMI (Planta o Contratados) que:

A) Sean Personal de Salud Matriculados y/o Trabajadores y Trabajadoras de PAMI (Recomendado)

OBRAS SOCIALES



SAN FRANCISCO
FARMACIAS

Sector Emisor: Área Obras Sociales

Fecha: 31 de Marzo 2026

Revisión: 01

B) Tengan 65 años o más (Se recomienda FLUXVIR, pero si no se encuentra disponible en el stock se puede utilizar VIRAFLU)

C) Sean personas gestantes: en cada embarazo y en cualquier trimestre de la gestación.

D) Púerperas: hasta el egreso de la maternidad –máximo 10 días- si no recibió la vacuna durante el embarazo.

E) Niños/as de 6 a 24 meses: deben recibir dos dosis separadas por al menos 4 semanas, excepto los niños/as que ya hubieran recibido dos dosis en años anteriores.

SÍ NECESITAN ÓRDEN MÉDICA:

1) Personas Afiliadas

2) Personas Trabajadoras de PAMI (Planta o Contratados) que: - Tengan entre 2 y 64 años que presenten factores de riesgo (En estos grupos se recomienda VIRAFLU, pero si no se encuentra disponible en el Stock se puede utilizar FLUXVIR) Son considerados factores de riesgo: obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedad oncohematológica, trasplante y/o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros. Recordar que la orden médica puede ser una receta papel o una fotografía de una foto papel, que incluya los datos de la persona a inmunizar (Nombre Completo / DNI / Número de Beneficio para afiliados y afiliadas).

VACUNAS ANTINEUMOCOCCICAS Estrategia secuencial

NO NECESITAN ORDEN MÉDICA:

1) Personas Afiliadas

2) Personas Trabajadoras de PAMI (Planta o Contratados) que: Personas de 65 años y más: -Esquema de vacunación secuencial- No necesitan orden médica. Se recomienda aprovechar la oportunidad para recibir vacuna antigripal. 1º dosis: VCN13 (POR ÚNICA VEZ, INDAGAR NO HABERLA RECIBIDO EN INSTANCIAS PREVIAS) 2º dosis: VPN23 con un intervalo mínimo de 12 meses luego de la VCN13. Vacuna no disponible por falta a nivel global.

SÍ NECESITAN ÓRDEN MÉDICA: 1) Personas Afiliadas 2) Personas Trabajadoras de PAMI (Planta o Contratados) que: Sean personas de entre 5 y 64 años que presenten condiciones de riesgo. Recordar que la orden médica puede ser una receta papel o una fotografía de una foto papel, que incluya los datos de la persona a inmunizar (Nombre Completo / DNI y/o Número de Beneficio para afiliados y afiliadas y diagnóstico que indique la condición de riesgo). Las indicaciones son: A. Inmunocomprometidos (inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, infección por VIH, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, leucemia, linfoma y enfermedad de Hodgkin, enfermedades neoplásicas, inmunodepresión farmacológica, trasplante de órgano sólido, mieloma múltiple, asplenia funcional o anatómica, anemia de células falciformes, implante coclear, fístula de LCR) • 1era. dosis: vacuna conjugada 13 valente 2da. dosis: vacuna polisacárida 23 valente a las 8 semanas. Vacuna no disponible por falta a nivel global. 1er. refuerzo: vacuna polisacárida 23 valente a los 5 años. Vacuna no disponible por falta a nivel global. 2do. refuerzo: vacuna polisacárida 23 valente a los 65 años (si el primer refuerzo fue administrado antes de los 60 años).

OBRAS SOCIALES



Sector Emisor: Área Obras Sociales

Fecha: 31 de Marzo 2026

Revisión: 01

Vacuna no disponible por falta a nivel global. B. No Inmunocomprometidos (cardiopatía crónica, enfermedad pulmonar crónica, diabetes mellitus, alcoholismo, enfermedad hepática crónica, tabaquismo) • 1era. dosis: vacuna conjugada 13 valente 2da. dosis: vacuna polisacárida 23 valente al año de la primera dosis. Vacuna no disponible por falta a nivel global. 1er. refuerzo: vacuna polisacárida 23 valente a los 65 años (respetando intervalo mínimo de 5 años con dosis previa). Vacuna no disponible por falta a nivel global. C. Trasplante de células hematopoyéticas Inicio de la vacunación a partir de los 6 meses del trasplante con vacuna conjugada 13 valente (esquema 0, 2 y 4 meses). A los 12 meses de finalizado esquema completar con 4ª dosis con vacuna polisacárida 23 valente o conjugada 13 valente si hubiera enfermedad injerto contra huésped.